

A láz kezelése

Életkor	Hőmérséklet	Teendő
Csecsemő		
3 hónapos korig	38 C vagy magasabb végbélben	Hívjon orvost, akkor is, ha nincs más tünet!
3 hónapos kortól 23 hónapig	38.9 C fokig szájból mérve	Pihenjen és igyon a gyermek sok folyadékot, Gyógyszer nem kell. Hívjon orvost, ha a gyermek szokatlanul ingerlékeny, levert vagy rossz a közérzete.
3 hónapos kortól 23 hónapig	38.9 C fok felett szájból mérve	Kapjon a gyermek paracetamolt, 6 év felett ibuprofen is adható. Olvassa el pontosan a használati utasítást. 18 éves kor alatt aszpirin tilos! Hívjon orvost, ha a láz nem megy le, vagy egy napnál tovább tart.
Gyermekek		
2-18 év	38.9 C fokig szájból mérve	Pihenjen és igyon a gyermek sok folyadékot, Gyógyszer nem kell. Hívjon orvost, ha a gyermek szokatlanul ingerlékeny, levert vagy rossz a közérzete
2-18 év	38.9 C fok felett szájból mérve	Kapjon a gyermek paracetamolt, 6 év felett ibuprofen is adható. Olvassa el gondosan a használati utasítást. 18 éves kor alatt aszpirin tilos! Hívjon orvost, ha a láz nem megy le, vagy 3 napnál tovább tart.
Felnőtt		
18 év felett	38.9 C fokig szájból mérve	Pihenés és sok folyadék. Gyógyszer nem szükséges. Hívjon orvost, ha a láz súlyos fejfájással, tarkómerevséggel, légszomjjal, vagy egyéb szokatlan tünetekkel jár.
18 év felett	38.9 C fok felett szájból mérve	Ha rossz a közérzete, vegyen be paracetamolt, ibuprofent vagy aszpirint. Olvassa el gondosan a használati utasítást. Hívjon orvost, ha nem megy le a láza, ha folyamatosan 39,4 C vagy felette van, vagy 3 napnál tovább tart.

Forrás: Informed